



Presidencia de la República del Paraguay



PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDADES CONTRA LAS QUE PROTEGE	EDAD O CONDICIÓN DE RIESGO PARA ADMINISTRACIÓN	DOSIS	VÍA Y SITIO DE ADMINISTRACIÓN
BCG	Formas graves de Tuberculosis: *Meningitis tuberculosa *Tuberculosis miliar	Menores de 1 año Con énfasis en el Recién Nacido	Dosis única	Intradérmica Tercio superior de la región deltoidea del brazo derecho
ROTAVIRUS	Diarreas por Rotavirus (previene la deshidratación severa y complicaciones)	2 meses 4 meses	Primera dosis Segunda dosis	Oral
OPV (SABIN ORAL)	Poliomielitis o Parálisis infantil	2 meses 4 meses 6 meses 18 meses 4 años	Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis Primer refuerzo Segundo refuerzo	Oral 2 Gotas
PENTAVALENTE (DPT + HB + Hib)	Difteria - Tétanos - Tos Ferina - Hepatitis B - Meningitis - Neumonía y otras por Hib	2 meses 4 meses 6 meses	Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis	Intramuscular Cara anterolateral externa del muslo
DPT	Difteria Tétanos Tos ferina	18 meses (o 1 año después de la aplicación de la tercera dosis de Pentavalente) 4 años	Primer Refuerzo Segundo Refuerzo	Intramuscular: Cara anterolateral externa del muslo (18 meses) Brazo derecho o izquierdo (4 años)
SPR	Sarampión Parotiditis (paperas) Rubéola	12 meses 4 años	Primera dosis Refuerzo	Subcutánea Brazo izquierdo
AA	Fiebre Amarilla	1 a 59 años	Dosis única	Subcutánea Brazo derecho
Anti-Influenza estacional	Complicaciones por Influenza	6 a 17 meses 18 a 23 meses 24 a 35 meses	2 dosis con intervalo de un mes 1 dosis 1 dosis	Intramuscular Cara anterolateral externa del muslo
		Adultos mayores (60 años y más) Enfermos crónicos (todas las edades) Embarazadas Trabajadores de salud Trabajadores agrícolas	1 dosis cada año	Intramuscular Brazo derecho o izquierdo
Td	Tétanos Difteria	10 años	1 dosis según antecedentes con DPT/Penta	Intramuscular Brazo derecho o izquierdo
		Otras edades y embarazadas	Según antecedentes con DPT/Penta	
HB	Hepatitis B	Enfermos crónicos, Trabajadores de salud y otros grupos de riesgo	Primera dosis: primer contacto Segunda dosis: 1 mes de la primera Tercera dosis: 6 meses de la seg.	Intramuscular Brazo derecho o izquierdo

www.medica.com.py

www.guiamedicaparaguaya.com